

**SAĞLIK BAKANLIĞI****45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar****HAFTALIK COVID-19 VERİ TABLOLARI (27.07.2022)**

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU			
	19.07.2022	26.07.2022	Değişim
Toplam vaka sayısı	3.231	2.363	-26,86%
Yerel vaka sayısı	3.231	2.363	-26,86%
Yurtdışı vaka	0		0,00%
100.000 de vaka sayısı	845,81	618,59	-26,86%
100.000 de yerel vaka sayısı	845,81	618,59	-26,86%
Test sayısı	23.434	18.667	-20,34%
Test pozitiflik oranı	13,79%	12,66%	-8,19%
Hastanede tedavi gören	43	25	-41,86%
Yoğun bakımda tedavi gören	3	3	0,00%
Yoğun bakım oranı	0,10%	0,13%	30,00%
Aktif vaka sayısı	3078	2159	-29,86%
Kaybedilen vaka sayısı	2	2	0,00%

İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI			
	19.07.2022	26.07.2022	Değişim
KKTC GENELİ	120,6	88,2	-26,87%
LEFKOŞA	170,6	131,8	-22,74%
GAZİMAĞUSA	109,1	76,6	-29,79%
GİRNE	98,3	66,3	-32,55%
İSKELE	54,2	40,4	-25,46%
GÜZELYURT	95,9	60,2	-37,23%
LEFKE	72,1	64,0	-11,23%

## KARARLAR

### A. ÜLKEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ KARARLAR

1. Komitemiz tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar kişiler, aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, Covid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.

### B. ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

2. Ada içi geçişlerde, kişiler Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmaya devam edecektir.

### C. MASKE İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanılması zorunludur.
2. Açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
3. Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler tüm alanlarda (açık, kapalı) maske kullanacaklardır.
4. Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.

### D. TESTLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

5. Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri)CE-IVD sertifikası olması zorunludur.
6. **Yaşlı bakım evi ve cezaevi çalışanları haftada bir Covid-19 testlerini yaptıracaklardır.**
7. **Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler haftada bir Covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar. Semptom gösteren kişiler testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri ziyaret edemeyeceklerdir.**
8. Semptom gösteren kişiler maske takacak ve antijen testini yaptıracaktır. Antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptıracaklardır.

### E. TEMASLI KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

9. Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

Ancak belirtilen süreden önce temaslı kişilerin semptom göstermeleri halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yaptıracaklardır.

## F. COVID-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

10.

- ✓ Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün)
- ✓ Başka bir test merkezine giderek ikinci kez test yapılması durumunda ikinci testin sonucu dikkate alınmayacaktır.
- ✓ İzolasyon süresi 7 gündür. 7. günün sonunda kişiler test yaptırmalarına gerek olmaksızın güncel hayatlarına devam edebilecektir.
- ✓ Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde **0533 842 8358 veya 1102** numaralarını arayarak yardım alabilirler.

Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman vb.) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı'nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

## G. AŞILARLA İLGİLİ KARARLAR

### - 18 Yaş ve Üzeri Kişiler İçin Önerilen Aşı Tablosu

Aşı Adı	Yaş Grubu	Sağlıklı veya hafif derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişiler		Orta veya ağır derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişiler**	
		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar	
Pfizer Biontech	18 yaş ve üzeri	Total doz: 3-4 *doz		Total doz 5**	
		1. doz ile 2.doz arası	En az 4-8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 3 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 5 hafta	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
		3.doz ile 4. doz arası	En az 4 ay	3.doz ile 4.doz arası	En az 3 ay
				4. doz ile 5. Doz arası	En az 4 ay
Johnson &Johnsson	18 yaş ve üzeri	Total doz: 2-3 doz***		Total doz: 4	
		1. doz ile 2. doz arası	En az 8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 4 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 4 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
3. doz ile 4. doz arası	En az 4 ay				
AstraZeneca	18 yaş ve üzeri	Total doz: 3-4****		Total doz: 4-5**	
		1. doz ile 2.doz arası	En az 3 -8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 4 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 3 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
		3.doz ile 4. doz arası	En az 4 ay	3. doz ile 4. doz arası	En az 3 ay
				4. doz ile 5. Doz arası	En az 4 ay
Sinovac	18 yaş ve üzeri	Total doz: 3-4*****		-	
		1. doz ile 2.doz arası	4 hafta	-	-
		2. doz ile 3. doz arası	3 ay	-	-
		3.doz ile 4. doz arası***	En az 4 ay	-	-

\* 4. doz Pfizer BioNTech aşısı sağlıklı veya bağışıklık sistemi hafif derecede baskılı olan 50 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

\*\* 5. doz Pfizer BioNTech aşısı bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzerine önerilmektedir.

\*\*\* Johnson &Johnsson aşısı ile aşılanan kişilerin 2. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırımları önerilmektedir. 3. doz aşısı (Pfizer Biontech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

\*\*\*\* AstraZeneca aşısı ile aşılanan kişilerin 3. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırmaları önerilmektedir. 4. doz aşısı (Pfizer BioNTech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

\*\*\*\*\* Önceden Sinovac ile 3 doz veya 2 Sinovac+ 1 BioNTech ile aşılanan 50 yaş ve üzeri kişilerle, bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere 4. doz aşısı (Pfizer BioNTech) yapılması önerilmektedir.

### - 5 Yaş ve 17 Yaş İçin Önerilen Aşı Tablosu

Aşı Adı	Yaş Grubu	Sağlıklı veya hafif derecede bağışıklık sistemi baskılı olan çocuklar		Orta veya ağır derecede bağışıklık sistemi baskılı olan çocuklar	
		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar	
Pfizer Biontech	5 yaş-11 yaş	Total doz: 3		Total doz: 4	
		1. doz ile 2. doz arası	En az 3 -8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 3 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 5 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
				3. doz ile 4. doz arası	En az 3 ay
Pfizer Biontech	12 yaş -17 yaş	Total doz: 3		Total doz: 5	
		1. doz ile 2.doz arası	En az 3 -8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 3 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 5 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
				3. doz ile 4. doz arası	En az 3 ay
				4. doz ile 5. Doz arası	En az 4 ay